

## CBDCA+PEM+BEV

作成日 : 2020年5月1日

ID name	薬品名	ベバシズマブ ペトレキセド カルボプラチン	15 mg/kg 500 mg/m <sup>2</sup> (25+GFR) × 5 mg/body
---------	-----	-----------------------------	---

身長 体重 体表面積 GFR=(140-年齢) × 体重/72 × 1/Scr × 0.85

投与スケジュール  
1クール 3週  
がん種 非小細胞癌(非扁平上皮) (5クール目からカルボプラチンのみ中止し維持療法へ)

メイン	投与速度	側管	投与速度
1、生食 100mL 1本 デキサメタゾン4.95mg (ホスアプレピタント不使用时は9.9mg) パロノセトロン0.75mg ホスアプレピタント150mg	30分		
2、ベバシズマブ( )mg 生食 100mL 初回90分、2回目60分、3回目30分に短縮可	90分		
3、ペトレキセド( )mg 生食 100mL	10分		
4、カルボプラチン( )mg 生食 or 5%ブドウ糖 250mL	1時間		
5、生食 50mL	全開		

6、ヘパロック

※初回投与の7日以上前から投与中止後22日までの間、葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与、及びビタミンB12として1回1mgを9週毎に筋肉内投与する。  
尚、症状に応じて適宜調節を行う。