

# CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ

作成日 : 2020年5月1日

ID name	薬品名	ペムブロリズマブ注	200 mg/body
		ペメトレキシド注	500 mg/m <sup>2</sup>
		カルボプラチン注	(25+GFR) × 5 mg/body

身長 体重 体表面積 GFR=(140-年齢) × 体重 / 72 × 1 / Scr × 0.85

がん種	非小細胞癌(非扁平上皮)	投与スケジュール 1クール 3週 (5クール目からカルボプラチンのみ中止し維持療法へ)
-----	--------------	---

メイン	投与速度	側管	投与速度
1、生食 100mL デキサメタゾン注 パロノセトロン注 ホスアプレピタント注	1本 30分 4.95mg(ホスアプレピタント不使用時は9.9mg) 0.75mg 150mg		
2、ペムブロリズマブ注200mg 生食 100mL	30分		
3、ペメトレキシド注(          )mg 生食 100mL	10分		
4、カルボプラチン注(          )mg 生食 or 5%ブドウ糖 250mL	1時間		
5、生食 50mL	全開		

6、ヘパロック

※初回投与の7日以上前から投与中止後22日までの間、葉酸として1日1回0.5mgを  
連日経口投与、及びビタミンB12として1回1mgを9週毎に筋肉内投与する。  
尚、症状に応じて適宜調節を行う。