

FOLFIRI+Cmab 1コース(d1)

作成日: 2020年5月1日

ID	薬品名	セツキシマブ注	400 mg/m ²
name		イリノテカン注	150 mg/m ²
		トロイコボリン注	200 mg/m ²
身長		フルオロウラシル注 (bolus)	400 mg/m ²
体重		フルオロウラシル注 (持続注入)	2400 mg/m ²
体表面積			

がん種 大腸癌 投与スケジュール 1クール2週

メイン	投与速度	側管	投与速度
1、生食 50mL			
2、生食 100mL	30分		
デキサメタゾン注4.95mg(ホスアプレピタント不使用時は9.9mg) パロノセトロン注0.75mg ホスアプレピタント注150mg d-クロルフェニラミンマレイン酸注5mg			
3、セツキシマブ注()mg	2時間		
生食 (全量250mL) (2回目以降は1時間まで短縮可)			
4、生食 50mL	30分		
5、トロイコボリン注()mg	2時間	6、イリノテカン注()mg	1.5時間
生食 250mL		生食250mL	
イリノテカンと同時開始		トロイコボリンと同時開始	
7、フルオロウラシル注()m bolus			
生食 50mL トロイコボリン、イリノテカン終了後			
8、生食 50mL	bolus		
9、フルオロウラシル注()m	46時間		
生食 (表参照 ※) 2mL/hr インヒューザーポンプ使用 生食 50mL bolus終了後			

10、ヘパロック

備考:d2、d3 ベタメタゾン錠 8mg(16錠)。ホスアプレピタント使用時はなし。4mg(8錠)は可。

FOLFIRI+Cmab 1コース(d8、22・・・)

ID	薬品名	セツキシマブ注	250 mg/m ²
name			
身長			
体重			
体表面積			

がん種 投与スケジュール

メイン	投与速度
1、生食 50mL	
2、d-クロルフェニラミンマレイン酸注5r	30分
生食 50mL	
3、セツキシマブ注()mg	1時間
生食 (全量 250mL)	
4、生食 50mL	30分

5、ヘパロック