

FOLFIRI+RAM

作成日: 2020年5月1日

ID	薬品名	ラムシルマブ注	8 mg/kg
name		イリノテカン注	150 mg/m ²
		トロイコボリン注	200 mg/m ²
身長		フルオロウラシル注 (bolus)	400 mg/m ²
体重		フルオロウラシル注 (持続注入)	2400 mg/m ²
体表面積			

がん種 大腸癌 投与スケジュール : 1クール2週

メイン	投与速度	側管	投与速度
1、生食 50mL			
2、生食 100mL デキサメタゾン注4.95mg (ホスアプレピタント不使用時は9.9mg) パロノセトロン注0.75mg d-クロルフェニラミンマレイン酸注5mg ホスアプレピタント注150mg	30分		
3、ラムシルマブ注()mg 生食 250mL	60分		
4、トロイコボリン注()mg 生食 250mL イリノテカンと同時開始	2時間	5、イリノテカン注()mg 生食 250mL トロイコボリンと同時開始	1.5時間
6、フルオロウラシル注()mg bolus 生食 50mL トロイコボリン、イリノテカン終了後			
7、生食 50mL	bolus		
8、フルオロウラシル注()mg インヒューザーポンプ使用 生食 50mL bolus終了後	46時間 2mL/hr		

9、ヘパロック

備考: d2、d3 ベタメタゾン錠 8mg(16錠)。ホスアプレピタント使用時はなし。4mg(8錠)は可。