FOLFIRINOX+Bev

作成日:2020年5月1日

ID	薬品名	ベバシズマブ注	5 mg/kg
name		イリノテカン注	150 mg/㎡
		オキサリプラチン注	85 mg/㎡
身長		l-ロイコボリン注	200 mg/㎡
体重		フルオロウラシル注(持続注入)	2400 mg/㎡
体表面積			

がん種　　大腸癌　　投与スケジュール　:　1クール2週

メイン	投与速度	側管	投与速度
1、生食　50mL			
2、生食　100mL デキサメタゾン注4.95mg(ホスアプレピタント不使用時は9.9mg パロノセトロン注0.75mg ホスアプレピタント注150mg	30分		
3、ベバシズマブ注(　　)mg 生食　100mL (1回目90分、2回目60分、3回目30分まで短縮可)	90分		
4、イリノテカン注(　　)mg 生食　250mL	90分		
5、l-ロイコボリン注(　　)mg 5%ブドウ糖　250mL オキサリプラチンと同時開始	2時間	6、オキサリプラチン注(　　)mg 5%ブドウ糖　250mL l-ロイコボリンと同時開始	2時間
7、生食　50mL	bolus		
8、フルオロウラシル注(　　)mg インヒューザーポンプ使用 生食　50mL bolus終了後	46時間 2mL/hr		

9、ヘパロック

備考:d2、d3　ベタメタゾン錠　8mg(16錠)。 ホスアプレピタント使用時はなし。4mg(8錠)は可。