

mFOLFOX6+Bev

作成日:2020年5月1日

ID	薬品名	ベバシズマブ注	5 mg/kg
name		オキサリプラチン注	85 mg/m ²
		トロイコボリン注	200 mg/m ²
身長		フルオロウラシル注(bolus)	400 mg/m ²
体重		フルオロウラシル注(持続注入)	2400 mg/m ²
体表面積			

がん種 大腸癌 投与スケジュール : 1クール2週

メイン	投与速度	側管	投与速度
1、生食 50mL			
2、生食 100mL デキサメタゾン注4.95mg(ホスアプレピタント不使用時は9.9mg) パロノセトロン注0.75mg ホスアプレピタント注150mg	30分		
3、ベバシズマブ注()mg 生食 100mL (1回目90分、2回目60分、3回目30分まで短縮可)	90分		
4、トロイコボリン注()mg 5%ブドウ糖 250mL オキサリプラチンと同時開始	2時間	5、オキサリプラチン注()mg 5%ブドウ糖 250mL トロイコボリンと同時開始	2時間
6、フルオロウラシル注()mg 生食 50mL トロイコボリン、オキサリプラチン終了後	bolus		
7、生食 50mL	bolus		
8、フルオロウラシル注()mg インヒューザーポンプ使用 生食 50mL bolus終了後	46時間 2mL/hr		
9、ヘパロック			

備考:d2、d3 ベタメタゾン錠 8mg(16錠)。ホスアプレピタント使用時はなし。4mg(8錠)は可。