

mFOLFOX6+Cmab (d1)

作成日: 2020年5月1日

ID	薬品名	セツキシマブ注	400 mg/m ²
name		オキサリプラチン注	85 mg/m ²
		l-ロイコボリン注	200 mg/m ²
身長		フルオロウラシル注 (bolus)	400 mg/m ²
体重		フルオロウラシル注 (持続注入)	2400 mg/m ²
体表面積			

がん種 大腸癌 投与スケジュール 1クール2週

メイン	投与速度	側管	投与速度
1、生食 50mL			
2、生食 100mL デキサメタゾン注4.95mg(ホスアプレピタント不使用時は9.9mg) パロノセトロン注0.75mg ホスアプレピタント注150mg d-クロルフェニラミンマレイン酸注5mg	30分		
3、セツキシマブ注()mg 生食 (全量250mL) (2回目以降1時間まで短縮可)	2時間		
4、生食 50mL	30分		
5、l-ロイコボリン注()mg 5%ブドウ糖 250mL オキサリプラチンと同時開始	2時間	6、オキサリプラチン注()mg 5%ブドウ糖 250mL l-ロイコボリンと同時開始	2時間
7、フルオロウラシル注()mg 生食 50mL l-ロイコボリン、オキサリプラチン終了後	bolus		
8、生食 50mL	bolus		
9、フルオロウラシル注()mg インヒューザーポンプ使用 生食 50mL bolus終了後	46時間 2mL/hr		

10、ヘパロック

備考:d2、d3 ベタメタゾン錠 8mg(16錠)。ホスアプレピタント使用時はなし。4mg(8錠)は可。

mFOLFOX6+Cmab (d8、22・・・)

ID	薬品名	セツキシマブ注	250 mg/m ²
name			
身長			
体重			
体表面積			

がん種 投与スケジュール

メイン	投与速度
1、生食 50mL	
2、デキサメタゾン注8.25mg d-クロルフェニラミンマレイン酸注5mg 生食 50mL デキサメタゾン減量、中止可	30分
3、セツキシマブ注()mg 生食 (全量 250mL)	1時間
4、生食 50mL	bolus

5、ヘパロック